



ANEXOS

Anexo I




INEGI (2009) "Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Aquismón, San Luis Potosí". Clave geoestadística 24003"

Anexo II




INEGI (2009) "Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Aquismón, San Luis Potosí". Clave geoestadística 24003"

Anexo III




INEGI (2009) "Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Aquismón, San Luis Potosí". Clave geoestadística 24003"

Anexo IV




INEGI (2009) "Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Aquismón, San Luis Potosí". Clave geoestadística 24003"

Anexo V



INEGI (2009) "Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Aquismón, San Luis Potosí". Clave geoestadística 24003"


Anexo VI



INEGI (2009) "Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Aquismón, San Luis Potosí". Clave geostadística 24003"


Anexo VII

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Anexo VIII

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Region	Clave	Municipio
Altiplano	015	Charcas
	006	Catorce
	007	Cedral
	017	Guadalcázar
	020	Matamoros
	022	Moctezuma
	025	Salinas
	033	Santo Domingo
	044	Varadero
	045	Venado
	047	Villa de Guadalupe
	048	Villa de la Paz
	049	Villa de Ramos
Centro	051	Villa Hidalgo
	056	Villa de Anista
	001	Ahuacatlan
	004	Armadio de los Infante
	009	Cerro de San Pedro
	021	Mexquic de Carmona
	028	San Luis Potosí
	032	Santa María del Río
	035	Soledad de Graciano Sánchez
	043	Tierra Nueva
	046	Villa de Arriaga
	050	Villa de Reyes
	Huasteca	055
003		Aquismón
063		Axtla de Terrazas
013		Ciudad Valles
014		Coxcatlán
016		Ebano
056		El Naranjo
018		Huahuasteca
057		Mafapa
026		San Antonio
029		San Martín Chalchicuautla
034		San Vicente Tancuayalab
Media		036
	037	Tamazunchale
	038	Tampacán
	039	Tampamolón Corona
	040	Tamulín
	012	Tancanhuitz
	041	Tanlañas
	042	Tanquián de Escobedo
	054	Xilitla
	002	Alaquines
	005	Cárdenas
	008	Cerritos
	010	Ciudad del Maíz
011	Ciudad Fernández	
019	Lagunillas	
023	Rayón	
024	Rioverde	
027	San Ciro de Acosta	
030	San Nicolás Tolentino	
031	Santa Catarina	
052	Villa Juárez	


SIMBOLOGÍA

- LIMITE MUNICIPAL
- ESTADOS COLINDANTES
- LIMITE ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

AUTORES
Severino Ramírez F.
ELABORO
Dr. Federico Severino Ramírez
LIN. DE DISEÑO S. R. A. DE SAN LUIS P. JUNIO 2008
FUENTE
INEGI (2005). Muestra geoespacial municipal. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Aguascalientes, Agt.


Fuente: SEGAM (2008) "Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de San Luis Potosí II" México. Agenda Ambiental, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pág. 5

Anexo IX



Fuente: SEGAM (2008) "Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de San Luis Potosí II" México. Agenda Ambiental, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pág. 9


Anexo X



Fuente: SEGAM (2008) "Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de San Luis Potosí I" México. Agenda Ambiental, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pág. 75

Anexo XI


VEGETACIÓN 1961 EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Fuente: SEGAM (2008) "Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de San Luis Potosí III" México. Agenda Ambiental, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pág. 141

Anexo XII


FISIOGRAFÍA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Fuente: SEGAM (2008) "Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de San Luis Potosí II" México. Agenda Ambiental, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pág. 12

Anexo XIII

RELIEVE SIMULADO



Relieve Simulado
Elevation

2755.556 - 3100
2411.111 - 2755.556
2066.667 - 2411.111
1722.222 - 2066.667
1377.778 - 1722.222
1033.333 - 1377.778
688.889 - 1033.333
344.444 - 688.889
0 - 344.444

FUENTE:
 CURVAS DE NIVEL DEL COPLANEO VECTORIAL
 ESC 1:250 000 DE INEGI 2004. PROCESADAS
 CON EL SOFTWARE ARCSYS S.S.
 LAB. SIG AGENDA AMBIENTAL

SIMBOLOGIA


[Red line]	LIMITE ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
[Black line]	LIMITE MUNICIPAL
[Grey line]	ESTADOS COLINDANTES

FUENTE:
 Marco Geoespacial Municipal 2005 (HECH)

LABORATORIO DE SIG DE AGENDA AMBIENTAL, UNLP
 488 - 333

Anexo XIV


REGIONES PETROGRÁFICAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Fuente: SEGAM (2008) "Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de San Luis Potosí II" México. Agenda Ambiental, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pág. 25

Anexo XV


REGIONES GEOMORFOLÓGICAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Fuente: SEGAM (2008) "Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de San Luis Potosí II" México. Agenda Ambiental, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pág. 26

Anexo XVI


CLIMA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Fuente: SEGAM (2008) "Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de San Luis Potosí II" México. Agenda Ambiental, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pág. 116

Anexo XVII


EROSIÓN EÓLICA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Fuente: SEGAM (2008) "Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de San Luis Potosí V" México. Agenda Ambiental, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pág. 3

Anexo XVIII

ÁREA NATURAL PROTEGIDA ESTATALES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Fuente: SEGAM (2008) "Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de San Luis Potosí IV" México. Agenda Ambiental, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pág. 4

ANEXO XIX



<i>Crax rubra</i>	—Cracidae—
Nombre Común	<i>Hocofaisán</i>
Nombre en Inglés	<i>Great Curassow</i>
Señas de Campo	Parecido a las aves de corral, del tamaño de un guajolote, con la cresta rizada. Macho: Negro brillante con el vientre blanco. Note la cresta alborotada y la bulbosa protuberancia amarilla encima del pico. Hembra: Más pequeña, rojiza brillante, con una sombra de negro en la cola, más pálida de abajo. Las alas y la cola moteada o barradas (variable). Cabeza, cuello y cresta recurvados, cuadriculados con blanco y negro.
Especies parecidas	Pava cojolita
Voz	El macho tiene un agudo y delgado silbido juiiii y juip; también jui,jui,jui. Un chirrido huip. Algunas veces combinado como juip juiiii (subiendo de tono). Durante el cortejo es un grave silbido que termina en juu-ju-ju; bum. La hembra produce un suave hmmm y también un jut-jut (Eisenmann).
Distribución	De México a Colombia.
México	En tierras bajas hasta los 900 m., s, San Luis Potosí al S hasta Chiapas y pen. De Yucatán. Su distribución actual probablemente es más restringida, no encontrándose al N del S Veracruz. Su sobrevivencia en la isla de Cozumel es dudosa.
Hábitat	Bosques húmedos primarios
Fuente: Tory Peterson, Roger y Chalif, Edward L. (2008). Aves de México. Guía de Campo. Identificación de todas las especies encontradas en México, Guatemala, Belice y El Salvador: Diana p. 80. Imagen tomada de http://www.vorneconsulting.com/mot/index.php . Elaboración propia de la tabla	



<i>Aratinga holochlora</i>	— <i>Psittacidae</i> —
Nombre Común	<i>Perico Aliverde, Quila</i>
Nombre en Inglés	<i>Great Curassow</i>
Señas de Campo	Los pericos del género <i>Aratinga</i> tienen la cola larga y puntiaguda, por lo que se les puede distinguir fácilmente de los loros tienen la cola cuadrada. Esta especie es la más grande (del tamaño de una paloma huilota) y no tiene azul en el ala. Es verde por arriba, amarillo verdoso de abajo y existen dos subespecies: 1) todo verde, incluyendo la garganta, (grupo <i>A.h. holochlora</i>) de la vertiente del Pacífico, y 2) adultos con la garganta roja (<i>A.h. rubritorquis</i>) de la vertiente del Golfo, desde el E de Guatemala hasta Nicaragua. Alguna vez se les trato como dos especies distintas (los inmaduros no tienen la garganta roja). Su vuelo no es tan errático como el de la mayoría de los pericos.
Especies parecidas	1) El Perico Pechisucio tiene la garganta y el pecho café olivo y azul en el ala. 2) El Perico frente naranja tiene la frente color naranja y azul en el ala.
Voz	Notas agudas y chillonas; un constante y agudo chachareo.
Distribución	Desde el trópico mexicano hasta el S Nicaragua.
México	Local en el NO (S Sonora, NE Sinaloa, SO Chihuahua) e isla Socorro. Al E desde Nuevo León, Tamaulipas hacia el S hasta Oaxaca y Chiapas.
Hábitat	En la base de las montañas (1000 a 2200 m.), bosques, matorrales, plantíos; no se encuentran en selvas altas.
Fuente: Tory Peterson, Roger y Chalif, Edward L. (2008). Aves de México. Guía de Campo. Identificación de todas las especies encontradas en México, Guatemala, Belice y El Salvador: Diana p. 142-143. Imagen tomada de http://www.vorneconsulting.com/mot/index.php . Elaboración propia de la tabla.	



<i>Psarocolius montezuma</i>	—Icteridae—
Nombre Común	Zacua Mayor, Oropendola Montezuma
Nombre en Inglés	Montezuma Oropendola
Señas de Campo	Individuos de esta especie, los más grandes de toda la familia, se ven frecuentemente en las colonias alrededor de largos nidos en forma de "bolsa calcetín", donde los machos cortejan haciendo "reverencias invertidas" acompañadas de un gorjeo. La cabeza negro, el dorso y alas color rojizo oscuro, el área malar pálida y el pico negro con la punta castaña. Ambas especies tienen la cola de colores amarillo y negro (aunque aparece totalmente amarilla por la parte de abajo).
Especies parecidas	Tordo amarillo pero no presenta los parches amarillos en las alas, La Zacua Cabecicastaña es más pequeña y tiene las alas negras.
Voz	El canto durante el cortejo es como el sonido que produce al vaciar agua en una botella: 5 a 7 glub's líquidos, haciéndole más agudos y rápidos (Chalif). Kruk, kruk, glug, glug, glug, glug-gluguglug ka-chío (R.T.P.). Llamado: kzweck (Eisenmann).
Distribución	México hasta Panamá
México	Tierras bajas del Golfo desde el S de Tamaulipas al S y E a través de Veracruz, N Oaxaca, N Chiapas, y la parte D de la pen. De Yucatán
Hábitat	Ecotonos y claros de bosques húmedos, árboles de ceiba y plantaciones
Fuente: Tory Peterson, Roger y Chalif, Edward L. (2008). Aves de México. Guía de Campo. Identificación de todas las especies encontradas en México, Guatemala, Belice y El Salvador: Diana p. 142-143. Imagen tomada de http://antpitta.com/images/photos/icterids/gallery_icterids.htm Elaboración propia de la tabla.	



<i>Ara militaris</i>	— <i>Psittacidae</i> —
Nombre Común	Guacamaya verde
Nombre en Inglés	Military Macaw
Señas de Campo	Es una guacamaya muy grande con la cola larga y puntiaguda; inicialmente era la guacamaya más ampliamente distribuida en México, pero ahora su población se visto reducida. Vuela batiendo las alas lentamente, como los aleteos de la garza. Es de color verde, con la cara y la cola rojas; las plumas primarias y la rabadilla azules. Tiene amarillo brillante bajo las alas y la cola. Generalmente se le ve volando en grupos, haciendo mucho escándalo.
Especies parecidas	Cotorra Serrana Oriental
Voz	Chillidos estridentes
Distribución	México; también Sudamérica desde el N de Venezuela hasta el NO Argentina.
México	En el O desde Sonora y SO Chihuahua hasta el istmo de Tehuantepec; también al Cen. México desde Zacatecas, S Nuevo León y Tamaulipas hasta el Edo. De México.
Hábitat	Bosques deciduos de montañas, zonas áridas y semiáridas, cañadas y copas de los árboles.
Fuente: Tory Peterson, Roger y Chalif, Edward L. (2008). Aves de México. Guía de Campo. Identificación de todas las especies encontradas en México, Guatemala, Belice y El Salvador: Diana p. 143-144. Imagen tomada de http://www.vorneconsulting.com/mot/index.php . Elaboración propia de la tabla.	

